TYPES DU RÈGNE ANIMAL

11
BUFFON EN ESTAMPES

PLANCHES ET ILLUSTRATIONS

PAR M. ÉDOUARD TRAVIÈS

TEXTE PAR M. HENRI-A. DE CONTY

PARIS

LEDOT AINÉ, ÉDITEUR,
47 $\frac{1}{2}$, RUE DE RIVOLI.

A. DE VRESSE, ÉDITEUR,
55. RUE DE RIVOLI.

PARIS. — IMPRIMERIE PAUL DUPONT, RUE DE GRENELLE-SAINT-HONORÉ, 45.

~~51
51
51~~

46
T78
R6
C10M

71
T78
Rare Book

PRÉFACE

ous éditions, il y a deux ans, sous le patronage des Familles, et avec le concours de MM. Édouard TRAVIÈS et Henry de CONTY, un Album spécialement destiné à la jeunesse, sous le titre de **BUFFON EN ESTAMPES**.

Notre première Édition se trouvant presque entièrement épuisée, et le succès de notre Album ayant dépassé nos espérances, nous vous offrons aujour-

d'hui, comme y faisant suite, une nouvelle série de planches choisies entre toutes, également remarquables par la beauté du sujet et par les explications amusantes, l'une et l'autre dues, comme les précédentes, au crayon apprécié de M. Édouard TRAVIÈS et à la plume intéressante de M. Henry de CONTY.

Puissent-elles, réunies en Album, devenir, comme nous en avons l'espoir, l'annexe obligée de notre première publication et satisfaire les Familles.

LEDOT AINÉ

174, rue de Nivoli.

219592

LE KANGOUROU.

Mammifère, de l'ordre des marsupiaux, il ressemble beaucoup par la grosseur et la figure à un lévrier. Ses membres antérieurs sont dans une grande disproportion avec ceux postérieurs. Aussi ne marche-t-il pas autrement que par sauts et par bonds, en sautant sur les deux pieds de derrière. Il tient alors la tête droite : cette tête, le cou et les épaules sont très-petits en comparaison des autres parties du corps. Sa queue, énorme et très-longue, presque autant que son corps, est épaisse à sa naissance et se termine en pointe à son extrémité. Elle est pour le kangourou un véritable support, et lui sert comme d'un troisième membre postérieur pour se soutenir et s'élancer par bonds et par sauts de 6 à 10 mètres, quand il est poursuivi et veut échapper à son ennemi. Quant aux membres de devant, qui sont beaucoup plus courts, il les replie près de sa poitrine et ne s'en sert guère que pour creuser la terre.

Son pelage court varie, suivant les espèces, du gris au fauve, et se com-

pose de poils soyeux et de poils laineux ; les premiers couvrent exclusivement les membres, la tête et la queue ; et les seconds se trouvent couvrir le surplus du corps de l'animal.

La nature a donné à la femelle du kangourou, ainsi qu'à tous les marsupiaux, une espèce de poche ou bourse, près des mamelles, dans laquelle ses petits ont grandi et se sont développés, et où ils viennent se réfugier au moindre bruit ou signe de danger, lors même qu'ils sont assez forts pour se suffire à eux-mêmes.

Les kangourous, de mœurs et d'habitudes pacifiques, se nourrissent de végétaux et de fruits ; ils habitent les bois, et leurs bandes peu nombreuses reconnaissent pour chefs les vieux mâles.

On les trouve dans la Nouvelle-Hollande.

Edouard Inarrie's

LE KANGOUROU ENFUMÉ.

Paris, LEDOT Aîné, Edit. rue de Rivoli, 174.

Imp. Becquet, à Paris.

Edouard Inarrie's.

LE KOALA.

LE KOALA

Mammifère didelphe (animal à bourse), originaire de la Nouvelle-Hollande (Australie).

La taille du koala est celle d'un gros chat.

Sa tête est grosse, ses oreilles, entièrement velues, sont courtes, larges et arrondies; sa mâchoire supérieure est armée de deux longues incisives au milieu, de quelques petites de chaque côté, et de deux canines.

Le corps de cet animal est trapu, couvert de poils touffus, longs et rudes, comme ceux de l'ours: c'est sans doute pour cela, et parce que son port a quelque analogie avec ce dernier, que le naturaliste Blainville l'a désigné sous le nom d'ours à poche.

Ses jambes sont courtes; ses cinq doigts de devant se divisent en deux parties ou groupes: d'un côté, le pouce et l'index; de l'autre, les trois doigts restants.

Ces doigts sont armés d'ongles tranchants et forts, dont il se sert pour

grimper et se creuser un terrier au pied des arbres où il se retire la nuit; pendant le jour, il reste habituellement sur une branche d'arbre touffu.

Ses membres postérieurs ont, comme ceux des phalangers, un pouce opposable.

Son pelage est de couleur cendrée légèrement bleuâtre au-dessus, et blanche en dessous.

Le koala a cela de particulier qu'il est dépourvu de queue.

La femelle est très-attachée à sa progéniture; dans sa sollicitude maternelle, elle porte son petit sur son dos, jusqu'à ce qu'il puisse subvenir lui-même à sa nourriture et soit assez fort pour pouvoir se défendre contre les attaques de ses ennemis.

Cet animal, assez rare, dont on ne connaît pas entièrement les mœurs et les habitudes, habite les contrées de la Nouvelle-Hollande.

Il se nourrit de feuilles, de racines et de fruits.

LE RENARD

Cet animal, de l'ordre des carnassiers, au museau pointu, est de la grosseur d'un chien ordinaire : c'est le type de l'adresse et de la ruse.

Actif, d'une vivacité ingénieuse et persistante, il médite ses coups, qu'il ne frappe qu'avec chance de réussir.

Dans sa prévoyance, il se pratique des asiles d'un accès imperceptible aux autres pour s'y retirer dans les moments difficiles. Ordinairement il habite sur le bord des bois, rôde autour des fermes et des chaumières, de manière à pouvoir épier les volailles, dont il est un impitoyable destructeur.

C'est la nuit qu'il exerce ses déprédations, en passant par-dessus ou par-dessous les clôtures. Il saecage toute une basse-cour, étrangle ses victimes, qu'il emporte une à une, ayant soin de les cacher dans son terrier ou sous la mousse pour se faire des provisions.

Au moindre mouvement, et lorsque le jour paraît, il s'enfuit prudemment, sauf à revenir en temps opportun.

C'est aussi un grand ennemi du gibier, qu'il poursuit partout au gîte et dans les garennes. Grand dénicheur de nids de perdrix, de cailles, il dévore sans pitié la mère qui couve et les œufs de son nid.

Le renard, dans sa voracité, n'est pas de goût difficile. Il mange aussi bien

des fruits et des raisins que des perdrix, des levrauts, des rats, des mulots, des serpents, des sauterelles, des écrevisses et du poisson.

Il est avide de miel et de cire; si les abeilles ou les frelons se vengent en le piquant de leurs dards acérés, il se roule à terre pour les écraser et les force bientôt, par ses attaques renouvelées, à désertir leurs ruches ou leurs guépiers. Le renard exhale une odeur très-prononcée.

Il ressemble beaucoup au chien par les parties intérieures; mais il en diffère par la tête, qu'il a plus grosse en proportion du corps. Il a aussi les oreilles plus courtes, la queue beaucoup plus grande, le poil plus long et plus touffu et les yeux plus inelinés.

Il naît les yeux fermés, et vit de dix à quinze ans. La plupart des renards ont le poil roux, quelques-uns ont le poil gris argenté : on les trouve en Europe, en Asie, en Amérique et dans les contrées voisines de l'équateur. La fourrure gris argenté est meilleure que la blanche; les bleus et les croisés sont recherchés à cause de leur rareté. Les noirs sont les plus précieux; c'est la fourrure la plus estimée et la plus recherchée après la zibeline. On en trouve au Spitzberg, au Groenland et dans le Canada, où il y en a de croisés et où l'espèce commune est moins rousse qu'en France.

Edouard Tournier's.

LE RENARD.

Paris, LEDOT Aimé Edit. rue de Rivoli, 174.

Imp. Becquet, à Paris.

Edouard Tournier's.

LE LIÈVRE.

LE LIÈVRE

Petit mammifère de l'ordre des rongeurs : ses dents incisives, au nombre de quatre pour la mâchoire supérieure, sont placées par paires, les unes derrière les autres ; la mâchoire inférieure est garnie de deux incisives.

C'est surtout la nuit que les lièvres cherchent leur nourriture, qui se compose de fruits, de racines, de feuilles, de grains et de plantes dont la sève est laiteuse.

Leur chair, quand ils sont pris à l'état sauvage, est estimée comme savoureuse et excitante.

Leur museau est arrondi et recouvert de poils soyeux ; la lèvre supérieure est fendue jusqu'aux narines.

Pendant le jour, ils se reposent au gîte, où ils dorment. Quand il fait clair de lune, on les aperçoit souvent qui jouent, sautent et courent les uns après les autres ; le moindre mouvement les effraye et les fait fuir.

Les lièvres dorment les yeux ouverts ; leurs yeux sont grands, placés de côté et clignotants. L'ouïe est d'une finesse extrême ; ils remuent leurs longues oreilles avec une grande facilité ; quand ils ont peur, ils les dressent, et s'enfuient avec rapidité. Comme ils ont le dessous des pattes garni de poils, ils marchent sans faire de bruit.

Ils ne courent bien qu'en montant, par sauts pressés, ayant les jambes de derrière plus longues que celles de devant et les cuisses musculeuses ; leur queue est courte et relevée.

Ils naissent les yeux ouverts, et ont cela de particulier qu'ils ont des poils en dedans de la bouche.

Ils vivent de six à huit ans.

Les lièvres sont sauvages, mais doux et susceptibles d'une certaine éducation. Ainsi on en montre dans les foires qui sont dressés à se tenir sur les pattes de derrière, et à battre du tambour.

Ils ne manquent pas d'instinct et de sagacité : ils se font un gîte, qu'ils choisissent à l'exposition du nord pour l'été, et du midi pour l'hiver. Quand ils craignent d'être vus, ils se cachent entre deux mottes de terre ; leur pelage subit des modifications suivant leur âge et le climat qu'ils habitent. La couleur ordinaire de ce pelage est rousse : on rencontre des lièvres dans toutes les contrées du monde ; partout la chasse qu'on leur fait est un grand amusement. Ceux qu'on voit en Laponie deviennent blancs pendant les dix mois rigoureux de l'année.

LE PORC-ÉPIC.

Mammifère sauvage et solitaire, de la classe des rongeurs : le goût de la chair de cet animal a quelque analogie avec celle du porc, dont il a le grognement. Les aiguillons dont il est armé ressemblent à un épi de blé barbu.

Sa peau est armée de dards composant une armure défensive contre les attaques d'ennemis bien plus forts que lui. Sur la nuque, les piquants sont plus longs que sur les autres parties du corps, et lui forment une espèce de huppe noire et blanche renversée vers le dos. Ces piquants sont comme des tuyaux de plumes dépourvus de barbes.

Originaire des climats les plus chauds de l'Afrique et des Indes, on le trouve dans les montagnes de l'Apennin, près de Rome, en Espagne et en Perse.

Le porc-épic est très-bas sur jambes, a la tête forte et courte, le museau très-gros et renflé, fendu comme celui du lièvre ; les grandes soies rudes qui composent ses moustaches sont d'un noir brillant. On lui voit deux grandes dents incisives, en avant de chaque mâchoire, avec lesquelles il coupe le bois, comme le fait le castor. Il n'a pas de canines; ses oreilles sont rondes et aplaties; sa

queue est courte; ses pieds antérieurs ont quatre doigts, les postérieurs cinq, et sont armés d'ongles robustes.

Buffon a fait justice de l'allégation erronée « que le porc-épic avait la faculté de pouvoir lancer ses piquants à une assez grande distance afin de blesser son ennemi. » Ce qui est vrai, c'est que, lorsque cet animal est irrité, ses piquants se redressent, se remuent vivement, et que ceux qui n'adhèrent à la peau que par un mince pédicule tombent à terre par suite de cette agitation.

Si le porc-épic est attaqué, il se défend en s'élançant à reculons sur son ennemi, qu'il transperce de ses traits acérés : de cette manière, il garantit sa tête.

Il n'aime que la solitude et les endroits sauvages, se fait un terrier ayant plusieurs issues, et ne quitte que pendant la nuit le lieu de sa retraite.

Malheur aux jardins où il peut pénétrer ! comme il est très-friand de légumes et de fruits, il ne manque pas de les dévorer. Quand il ne peut faire mieux, il se nourrit de graines et de racines. Pendant l'hiver, il reste comme endormi dans son terrier, et n'en sort qu'à l'époque du printemps.

Edouard Traviès.

LE PORC-ÉPIC.

27.

Paris, LEDOT Aîné, Edit. rue de Rivoli, 174.

Imp. Bequet, à Paris.

Edouard Traviès.

LE HÉRISSON.

LE HÉRISSE.

Genre de mammifère de la famille des insectivores. Son corps, ramassé, mesure 30 centimètres environ. Le hérisson est bas sur pattes et a le museau pointu.

Cet animal inoffensif a reçu de la nature une armure épineuse formée de poils qui ont la dureté de la corne ; cette armure couvre son dos et ses flancs.

Il a la faculté de se mettre en boule et de présenter de tous côtés des armes défensives, qui rebutent ses ennemis, car plus il est attaqué, plus il se hérisse ; il ne reprend alors sa forme naturelle que si on le met dans l'eau.

Pendant l'hiver, il reste replié en boule comme endormi dans un nid de mousse qu'il s'est préparé. Ce n'est qu'au printemps qu'il reprend ses pérégrinations nocturnes ; il ne bouge pas tant qu'il est jour.

Il vit de fruits et fouille la terre avec le nez ; il se nourrit de hannetons, de

scarabées, de grillons, d'escargots, de vers et de racines ; il aime aussi beaucoup la viande cuite ou crue.

On introduit souvent un hérisson dans un jardin qu'on veut purger de limaces et d'insectes. Le hérisson se trouve dans les bois, dans des trous de vieux arbres, dans des fentes de rochers et sous des amas de pierres.

Il approche rarement des habitations ; il préfère les lieux secs et élevés. On le prend à la main ; il ne se défend pas autrement qu'en se roulant en boule, hérissant ses piquants et restant immobile, sa tête et ses pattes rentrées en dedans, jusqu'à ce que le danger soit passé.

Il mange peu et sait se passer longtemps de nourriture.

La femelle construit son nid avec de la mousse et y met bas trois à cinq petits.

La couleur du hérisson est d'un gris brun.

Cet animal se trouve dans toute l'Europe, à l'exception des pays froids.

LE LEMMING.

Petit quadrupède ayant les caractères génériques des campagnols. Ce qui le distingue de ceux-ci, c'est qu'il a la queue plus courte. Son corps est long d'environ 13 centimètres.

Son poil fin est taché de diverses nuances de roussâtre, de gris, de blanc et de noir.

Une bande noire commence à l'œil jusque par derrière l'oreille et s'étend sur la tête et au delà du cou; le dessous de la tête, la gorge, le dessous du corps sont blancs.

Quoique ayant le corps épais et les jambes courtes, il est agile et court vite.

On le trouve dans les montagnes de Norwége et de Laponie; il y pullule en si grande quantité que lorsqu'il quitte ces montagnes (ce qu'il fait en troupes nombreuses tous les cinq à six ans) on s'en défend comme d'un véritable fléau.

Heureusement il craint d'entrer dans les maisons habitées; mais, par contre,

il dévaste tout dans les jardins et dans les champs. Il traverse facilement les rivières à la nage.

Il aboie comme un petit chien, et si on le frappe avec un bâton, il le mord à ce point qu'il ne le quitte pas des dents et se laisse enlever de terre. Il se défend avec courage contre les attaques des autres animaux. Il vit de racines et se creuse des trous sous terre.

Le mâle est plus grand que la femelle et a les taches noires plus développées.

Dans le beau temps, on en voit des troupes qui voyagent sur l'eau; leur nombre est si considérable que leurs cadavres empestent quelquefois l'air et causent des épizooties. Leur plus grand ennemi est le renard, qui, lorsqu'il les rencontre, en fait bonne justice.

La fécondité de la femelle est extrême: elle met bas cinq à six petits plusieurs fois dans une année. Les lemmings passent l'hiver sous la neige; ils se nourrissent alors de lichens et de racines, comme les taupes.

Edouard Trossel.

LE LEMMING.

Imp. Becquet, à Paris.
Edouard Trossel.

LE HAMSTER.

LE HAMSTER.

C'est une espèce de rat excessivement nuisible. Il vit sous terre et a l'habitude de ramasser des grains dont il fait ample provision dans son trou.

Le trou, fait par le mâle, a un conduit oblique à l'ouverture duquel est un petit exhaussement de terre ; à certaine distance de cette issue, il pratique un seul trou descendant perpendiculaire jusqu'à l'endroit où il fait sa demeure.

La femelle pratique également un trou oblique et plus profond et autant d'issues perpendiculaires pour donner passage à ses petits.

La profondeur de ces caveaux varie suivant l'âge du hamster qui, en vieillissant, agrandit sa demeure qu'il creuse, soit pour ses provisions, soit pour son nid, dans une étendue de 3 mètres.

Ces magasins se composent de grains secs, d'épis de blé, de cosses de pois et de fèves ramassées ordinairement au mois d'août, qu'ils nettoient intérieurement et dont ils transportent au dehors les détritux par le trou oblique.

Ces provisions sont ensuite cachées dans leurs trous, qu'ils bouchent avec de la terre pour empêcher qu'on ne les découvre.

Le hamster a le dos brun et le ventre noir.

On en trouve quelques-uns de couleur noire ou grise ; cela dépend de leur âge plus ou moins avancé.

On les rencontre dans quelques pays d'Allemagne. Il n'est pas rare qu'on mette leur tête à prix, tant ils se multiplient et commettent de dégâts.

LA LOUTRE.

Animal de l'ordre des voraces, avide de poisson, habitant le bord des rivières et des étangs, qu'il dépeuple.

Il nage très-bien, ayant des membranes à tous les pieds; il ne parcourt que les eaux douces, remontant ou descendant le cours des rivières à des distances considérables.

La loutre peut rester assez longtemps entre deux eaux : ses dents sont plus fortes et plus grosses que celles de la fouine.

Elle ne craint pas le froid ni l'humidité; à défaut de poissons, de grenouilles ou d'écrevisses, dont elle est friande, elle se nourrit de nouvelles écorces ou racines d'arbrisseaux, et même d'herbe.

Quand elle pénètre dans un vivier, elle tue plus de poissons qu'elle n'en peut

manger ou emporter : on a beau lui tendre des pièges, elle s'y laisse rarement prendre, elle semble flairer le danger.

La couleur de son pelage est brun en dessus et blanchâtre en dessous. Son poil, celui d'hiver surtout, fournit de bonne fourrure; il est employé dans la chapellerie; sa chair, ayant quelque goût de poisson, est mangée comme nourriture de maigre.

La loutre se nourrit de poissons, de crustacés, de grenouilles et de végétaux.

Elle se retire dans un simple trou tapissé de feuilles sèches, où elle dépose ses petits, qu'elle élève pendant deux mois; pour dépister ses ennemis, elle change souvent de demeure.

La loutre se trouve généralement en Europe, depuis la Suède jusqu'à Naples; on la rencontre aussi en Amérique.

Imp. Bequet, à Paris.

Edouard Fréville.

LA LOUTRE.

Edouard Fréville.

LE CASTOR.

LE CASTOR.

Genre de mammifères de l'ordre des rongeurs: le castor est amphibie, les parties antérieures de son corps ressemblent à celles des animaux terrestres, celles postérieures se rapportent aux animaux aquatiques.

« Ses caractères sont, dit M. Gervais, la queue aplatie horizontalement, couverte d'écaillés et de forme ovale; doigts au nombre de cinq, ceux de devant plus courts que ceux de derrière, qui sont réunis par une membrane; les dents au nombre de vingt, dont quatre incisives et seize molaires. Leurs dents, comme celles de tous les rongeurs, repoussent au fur et à mesure qu'elles s'usent, de sorte que leurs dimensions sont toujours à peu près les mêmes. »

Dès le mois de juin ou juillet, les castors se réunissent en société; ils arrivent en nombre de deux à trois cents, de plusieurs côtés à la fois.

Le lieu du rendez-vous, dit Buffon, est ordinairement le lieu de l'établissement, et c'est toujours au bord des eaux. Si ce sont des eaux plates et qui se soutiennent à la même hauteur comme dans un lac, ils se dispensent de construire une digue.

Mais, dans le cas contraire, ils établissent une chaussée qui traverse la rivière

comme une éeluse et va d'un bord à l'autre: elle a souvent 30 mètres de long sur 4 mètres d'épaisseur à sa base: construction énorme autant qu'elle est solide et qui par ses dispositions ingénieuses pourrait laisser croire qu'elle est l'œuvre d'un architecte habile. Ainsi, pour couper même de gros arbres et les seier, ils les rongent au pied sans autre instrument que leurs quatre dents incisives. Ils les font tomber du côté qu'il leur plaît, c'est-à-dire en travers de la rivière.

Ils seient des pieux, les plantent, en font un pilotis, sur lequel ils établissent les cabanes rondes ou ovales où ils font ensuite leur demeure les uns auprès des autres, où ils resserrent leurs provisions d'écorce de bois tendre dont ils sont très-friands. Excellents nageurs, leur queue leur sert de gouvernail.

Les castors diffèrent par la couleur suivant les climats des pays qu'ils habitent; dans les contrées les plus reculées du Nord, ils sont tout noirs et ce sont les plus beaux; aussi leur fourrure est-elle recherchée.

On les trouve en Amérique; ils sont très-communs vers le Nord; dans l'ancien continent, on en voit beaucoup dans les contrées les plus septentrionales; ils sont très-rares en France, en Italie, en Grèce, en Espagne et en Egypte.

L'AGOUTI.

Ce petit animal vorace, de l'ordre des rongeurs, est de la grosseur d'un lièvre, dont il a la taille, les mœurs et les habitudes, sauf qu'il grogne comme le cochon d'Inde, à qui il ressemble pour la forme extérieure.

Le poil de l'agouti est rude et de couleur brune ; quand on l'irrite, il mord violemment son adversaire ; son poil se dresse sur sa croupe et il frappe impatiemment la terre de ses pieds de derrière. Il aime les pays montueux et se retire dans des vieilles souches ou des creux d'arbres.

S'il se trouve près des habitations, il se nourrit de fruits, de patates ; s'il est relégué dans les bois, il se contente de feuilles, de racines, et de toutes sortes de substances végétales.

Ainsi que l'écureuil, il porte à sa gueule sa nourriture avec les pattes de devant.

Comme il a les jambes de devant plus courtes que celles de derrière, il court plus rapidement sur les terrains élevés ou les montagnes que dans la plaine.

Sa vue est bonne ; il a l'ouïe très-fine ; il a, ainsi que le lièvre, la lèvre supé-

rieure fendue, les oreilles et la queue courtes, la mâchoire supérieure proéminente ; il a le museau du loir, les dents de la marmotte, le cou long, les jambes grêles, et à cela de particulier, qu'il a quatre doigts aux pieds de devant et trois à ceux de derrière.

Il est d'un naturel craintif et méfiant. La femelle de l'agouti est féconde : elle produit et met bas, plusieurs fois par an, trois ou quatre petits, qu'elle enlève souvent de son nid pour éviter qu'ils ne soient dévorés par ses ennemis.

La chair de ce petit animal est très-recherchée ; on a pu l'acclimater en Europe depuis plusieurs années ; le Jardin d'Acclimatation de Paris possède deux individus de cette espèce, le mâle et la femelle.

Il est originaire des parties méridionales du nouveau monde ; il recherche les climats chauds.

On le rencontre à la Guyane, au Paraguay et au Brésil. Il était autrefois très-répandu dans les Antilles, d'où il a disparu.

Imp. Becquet, à Paris

Ernani Trouess.

L'AGOUTI.

30.

Ernani Trouess.

L'ORNITHORHYNQUE.

L'ORNITHORYNQUE.

Mammifère à la fois aquatique et terrestre, de l'ordre des édentés et de la division des monotrèmes.

Remarquable surtout par la forme singulière de son museau, qui est terminé par une espèce de bec corné aplati et de couleur noire, ressemblant assez à celui du canard ou de l'oie.

Des lamelles transversales garnissent les bords intérieurs de ce bec; on a remarqué qu'en arrière de chaque mâchoire était disposée une espèce de dent molaire qui lui servait à triturer ses aliments.

Cet animal avait été classé d'abord intermédiairement entre les mammifères et les oiseaux, à cause de cette conformation; on a reconnu aujourd'hui qu'il avait tous les caractères particuliers aux mammifères.

Sa tête petite est garnie de deux yeux rapprochés de son sommet; quand il nage entre deux eaux, ne laissant voir que le haut de sa tête, ce qui lui permet de voir ce qui se passe autour de lui; il a encore cet avantage que l'entrée de ses oreilles s'ouvre ou se ferme à volonté.

Il est bas sur de courtes jambes; son corps est de forme allongée, mesurant environ 30 centimètres de longueur; sa queue, courte, est aplatie; son pelage, touffu, est de couleur brune lustrée.

Ses pieds sont terminés par cinq doigts palmés armés de griffes aiguës; ceux de devant ont cela de particulier que la palmure dépasse les griffes, ce qui fait qu'il nage plus facilement.

Il se nourrit de mollusques, de vers, de grenouilles et de petits poissons, qu'il pêche avec son bec aplati.

C'est dans les marais et les rivières de la Nouvelle-Hollande que l'on trouve les ornithorynques.

Ils s'y construisent sur les bords un terrier pour eux et leurs petits, où ils viennent se retirer la nuit.

Le jour ils y dorment, après s'être mis en boule; ils n'en sortent que le soir pour aller chercher leur nourriture.

LE TATOU-ENCOUBERT.

Genre de mammifère de la catégorie des édentés.

Les tatous ont le corps épais, d'une longueur de cinquante centimètres ; ils sont bas sur jambes ; leur tête petite, oblongue et aplatie, se termine par un museau court et pointu.

Leurs yeux, placés latéralement, sont petits ; leurs oreilles, assez courtes, d'un ovale arrondi, sont pointues et mobiles. Leur système dentaire, d'après l'observation de Fr. Cuvier, est composé tantôt d'incisives et de molaires, tantôt de molaires seulement ; les dents, à peu près toutes semblables entre elles, sont faibles, cylindriques, sans émail dans l'intérieur, plus ou moins obliquement tronquées au sommet, distantes entre elles et paraissant pouvoir s'entre-croiser, lorsque les mâchoires sont rapprochées.

Le dessus de la tête, du cou et du corps entier est revêtu d'une carapace osseuse divisée par écailles. Cette carapace, lisse et très-dure, est composée de plusieurs pièces assez grandes et artistement disposées par bandes circulairement perpendiculaires.

Chacun des pieds de l'animal a cinq doigts épais propres à fouiller la terre ; ces pieds et la queue sont aussi recouverts d'une espèce de maille cuirassée.

Sa queue est longue, cylindrique et se termine en pointe ; ses jambes, les extrémités antérieures et le ventre sont garnis de poils longs et roides comme chez les porcs.

Les femelles sont très-fécondes ; leurs mamelles sont au nombre de quatre au plus.

Les tatous sont inoffensifs ; si on les attaque, ils rentrent leur tête, leurs pieds et leur queue et se roulent en boule, comme le font les hérissons.

Il vit de fruits, de racines, d'oiseaux, d'insectes et de mollusques.

C'est un animal d'un naturel doux et paisible, restant toute la journée dans son terrier, d'où il ne sort que pendant la nuit pour aller chercher sa nourriture. Le tatou-encoubert habite le Paraguay.

Edouard Ingres.

LE TATOU ENCOUBERT.

Paris, LEDOT Aîné, Edit. rue de Rivoli, 174.

Thop. Bequet à Paris.

Edouard Ingres.

L'ÂI À DOS BRÛLÉ.

L'AI.

Genre de mammifère, de l'ordre des édentés, connu à tort sous le nom de *paresseux* , car il est avéré aujourd'hui que la lenteur singulière de ses mouvements sur la terre ne provient que de sa bizarre conformation.

Cet animal disgracié de la nature est de la grosseur d'un chat, sa queue est courte, et ses pieds sont terminés par trois longs ongles crochus.

Très-inoffensif; cependant, lorsqu'il est attaqué il se défend en opposant à son adversaire ses ongles.

Il se traîne péniblement sur le sol jusqu'à ce qu'il ait trouvé un arbre, dont il ne peut atteindre le sommet que par suite d'un travail d'environ trois jours.

Alors il s'y cramponne et y reste, même pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que tous les fruits, les feuilles et les écorces soient épuisés.

Lorsqu'il ne lui reste plus rien à manger, comme il éprouve trop de peine pour descendre de son arbre, et que la faim le presse, il se pelotonne sur lui-même et se laisse tomber, puis s'efforce de gagner un autre arbre pour une nouvelle nourriture.

Les longs poils de l'ai ressemblent assez à de l'herbe fanée.

Il lui faut une température élevée. Aussi ne le rencontre-t-on guère que dans l'Amérique méridionale.

La femelle de l'ai ne produit qu'un petit à la fois : elle lui montre beaucoup d'attachement et le porte continuellement sur son dos, tant qu'il ne peut se suffire à lui-même et grimper sur les arbres pour y chercher sa nourriture. Il habite les forêts de la Guyane et du Brésil.

LA GAZELLE CORINNE.

Quadrupède du genre antilope, ressemblant beaucoup à la gazelle et au kevel, dont elle a l'élégance et la légèreté. Plus petite que ce dernier, ses cornes sont plus courtes et plus lisses; les anneaux en sont peu proéminents et à peine sensibles.

Ses oreilles sont longues de douze centimètres, sa queue de quatre-vingt-un millimètres, ses cornes ont seize centimètres et demi environ de longueur et douze millimètres d'épaisseur. Elles sont distantes l'une de l'autre de cinquante-quatre millimètres à leur naissance et de seize centimètres et demi à leur extrémité.

Au lieu d'anneaux ses cornes portent des rides transversales, serrées les unes contre les autres, au nombre de cinquante à soixante.

Le poil de la gazelle est court, luisant et fourni; la couleur de la tête, du cou, du dos et de la face extérieure des membres tire sur le fauve clair; la face interne du surplus est d'un bleu blanc; une bande brune est comme peinte sur ses flancs; sa queue est noire.

Cet animal, d'un naturel doux et paisible, vit en troupes nombreuses dans la Sénégambie.

Quand ils sont attaqués, ils ont l'instinct de se réunir en cercle, faisant face

à l'ennemi, et de lui présenter une forêt de cornes, avec lesquelles ils se défendent à outrance.

Il s'apprivoise facilement et s'accoutume à la domesticité; sa chair est très-bonne à manger et a beaucoup de rapports avec celle du chevreuil, se nourrissant comme lui d'herbes aromatiques, de bourgeons de jeunes arbres, d'ambrosie, d'oseille sauvage et d'écorces tendres.

Rien n'égale l'élégance de sa taille, la délicatesse de ses jambes et surtout la vivacité de ses grands yeux noirs, qui sont en même temps si tendres que les Orientaux en ont fait un proverbe en comparant les beaux yeux de leurs femmes aux yeux de la gazelle.

Les jambes de devant de la gazelle sont moins longues que celles de derrière, ce qui lui donne, comme aux lièvres, plus de facilité pour courir sur les montagnes qu'en plaine.

Elle court avec autant de légèreté que les chevreuils. Toutes, dans les deux sexes, ont des cornes permanentes comme chez les chèvres.

Les cornes des femelles sont seulement plus minces et plus courtes que celles des mâles.

Jasp. Bequaert, à Paris.

Edouard Traviès.

LA GAZELLE CORINNE.

L'ANTILOPE BUBALE.

L'ANTILOPE BUBALE.

Genre de mammifère de la famille des ruminants, ayant quelque rapport avec le cerf, la gazelle et la vache. On le trouve en Barbarie et dans tout le nord de l'Afrique.

Il a la taille supérieure à celle du cerf, à qui il ressemble par la forme et par les jambes; il a des cornes à peu près comme la gazelle; enfin il ressemble à la vache par la longueur de son museau et la disposition des os de la tête.

Ce qui caractérise surtout l'antilope bubale, c'est que ses cornes, noires, épaisses et annelées sans arêtes, sont implantées au sommet de sa tête et très-rapprochées à leur base, et qu'elles affectent une double courbure, se relevant en forme de lyre antique, les pointes recourbées en arrière.

Les épaules de l'antilope bubale sont élevées de manière à lui former une espèce de bosse sur le garot; la queue, descendant jusqu'aux jarrets, est terminée par un bouquet de poils noirs; ses oreilles sont semblables à celles de l'antilope.

Son poil est fauve sur le dos et quelquefois blanc sous le ventre; il est plus

mince vers sa racine que dans son milieu et son extrémité. Cette disposition est particulière au bubale et à l'élan. Dans presque tous les autres quadrupèdes c'est le contraire qui a été remarqué.

Le bubale n'a pas, comme la gazelle, une touffe de poils aux genoux.

La disposition en arrière de ses cornes lui profite lorsqu'il est attaqué; il met alors la tête entre ses jambes, et, la relevant vivement contre son agresseur, il lui fait ainsi de cruelles blessures.

Les anciens, dit G. Cuvier, connaissaient très-bien le bubale, et, lors de l'expédition d'Egypte, les Français en ont trouvé des figures fort reconnaissables parmi les hiéroglyphes des temples de cette contrée.

Il est d'un naturel sauvage et méchant; il marche en troupes nombreuses quand il est à l'état de liberté.

Pris jeune, il s'apprivoise cependant assez bien, et se mêle aux bœufs quand ils sont au pâturage.

LE CALAO RHINOCÉROS.

Cet oiseau des Indes méridionales est beaucoup plus grand que le corbeau d'Europe.

On lui a donné le surnom de rhinocéros, à cause de l'espèce d'appendice corné en forme de casque qui surmonte son bec, dont les proportions sont colossales relativement à la grosseur du corps.

Il a en effet au moins 32 centimètres de longueur : cette espèce de casque est rouge dans sa partie supérieure et d'un jaune rougeâtre jusqu'à son extrémité, qui se recourbe en pointe ; les ouvertures des narines sont situées au-dessous de cette excroissance, près l'origine du bec ; de longs cils noirs garnissent ses yeux brillants.

Tout son plumage est noir, bleuâtre, sa queue longue est blanche, sauf une

rayure noire horizontale avant la base de son extrémité ; ses pieds courts sont robustes et à écailles brunes.

Le calao se nourrit du fruit des arbres, au sommet desquels il aime à se percher, d'insectes, de petits oiseaux, de grenouilles, de souris et même de charogne ; avant de manger une souris, il l'aplatit en la serrant dans son bec pour l'amollir, et la jette en l'air pour la rattraper dans son large bec.

On peut apprivoiser cet oiseau, mais il devient triste et timide aussitôt qu'il est privé de sa liberté.

On trouve le calao rhinocéros à Java, aux Philippines, dans l'île de Ceylan, à Sumatra et dans les Indes méridionales.

Edouard Invernès

LE CALAO RHINOCÉROS.

33.

Paris, LEDOT, Aimé, Edit rue de Rivoli, 174.

Imp. Dequast, à Paris.

Edouard Invernès

LE TOUCAN DU PARA.

LE TOUCAN DU PARA.

Oiseau de la famille des rhamphaslidées, ordre des grimpeurs, au plumage brillant de vives couleurs, ayant le bec crénelé, d'une longueur et structure prodigieuses, hors de proportion avec sa tête.

Le toucan, avec ce bec mince et faible, ne peut rien saisir ni diviser, et, pour se nourrir, se trouve obligé de gober et avaler sa nourriture sans la concasser ni la broyer.

Ce bec n'est qu'une masse informe qui gêne le vol de l'oiseau et lui donne l'air embarrassé.

Il renferme une langue dont la structure est singulière : en effet, ce n'est point un organe charnu ou cartilagineux, comme la langue de tous les animaux ou des autres oiseaux, c'est une véritable plume renfermée dans le bec comme dans un étui.

Le plumage et la queue du toucan du Para sont d'un beau noir à reflets verdâtres ; sa poitrine est d'un rouge vif, les plumes de la gorge du mâle, qui sont d'une couleur orangée d'un ton éclatant, servent à faire des parures brillantes.

Ces oiseaux se nourrissent d'œufs des nids, de fruits et d'insectes ; quand ils veulent avaler quelque aliment, ils le lancent en l'air et le reçoivent adroitement dans leur large gosier.

Ils perchent sur la cime des arbres les plus élevés, sont inquiets, défiants, et se posent rarement à terre ; ils font entendre fréquemment un cri sec et dur qui correspond assez à ce mot : *toucaraca*.

Ils paraissent si sensibles au froid qu'ils cherchent à éviter la fraîcheur de la nuit dans les climats même les plus chauds du nouveau continent.

On trouve les toucans du Para au Brésil.

LA SPATULE.

Oiseau de l'ordre des échassiers ; il doit son nom à ce que son bec très-long et aplati, surtout vers son extrémité, est terminé en s'arrondissant à la manière d'une spatule.

Près de la tête, la mandibule supérieure est si large et si épaisse que le front semble y être entièrement engagé. Vers le haut de ce large bec sont les narines de l'oiseau. Il est de la grosseur du héron, mais il a les pieds moins hauts et le cou moins long et garni de petites plumes courtes ; celles du bas de la tête sont couvertes d'une peau noire, dure et écailleuse, longues et étroites, et forment un panache assez long qui retombe gracieusement en arrière. Ses yeux sont entourés d'une peau nue ; les pieds et les jambes d'une peau noire ; une portion de membrane unit les doigts vers leur jonction, et par son prolongement les borde légèrement jusqu'à l'extrémité : la forme du bec de ces oiseaux ne leur permet pas de se nourrir autrement que de mollusques, de serpents, de grenouilles, de poissons et d'insectes aquatiques.

La spatule, oiseau sociable et migrateur, habite les bords de la mer et les marais boisés près de l'embouchure des fleuves ; elle ne se trouve que rarement dans l'intérieur des terres, si ce n'est sur quelques lacs, et passagèrement sur le bord des rivières ; elle préfère les côtes marécageuses ; la femelle fait son nid sur des arbres élevés, dans les buissons ou dans les roseaux.

La ponte est de deux à quatre œufs blancs marquetés de taches de couleur rouille : on trouve la spatule en Bretagne, en Picardie et en Hollande. On la retrouve en Égypte, au cap de Bonne-Espérance et dans le nouveau continent.

Il y a des spatules blanches qui comptent parmi les oiseaux d'Europe, et la spatule rosée dans le premier âge, et rouge quand elle a atteint son développement complet ; cette dernière espèce appartient aux climats chauds de l'Amérique depuis la Louisiane jusqu'aux côtes des Patagons : on la rencontre aussi au Paraguay.

Jap. Becquet, à Paris.

Edouard Traviès.

LA SPATULE.

34.

Edouard Traviès.

L'ÉCHASSE.

Paris, LEDOT Aîné, Edit. rue de Rivoli, 174

L'ÉCHASSE.

Genre d'oiseau voyageur, le type des échassiers longirostres : les tarses de cet oiseau présentent une très-grande disproportion avec les autres membres, puisqu'ils ne lui permettent pas de porter son bec jusqu'à terre pour prendre sa nourriture. Ce bec est cylindrique, effilé, un peu aplati par les côtés vers la pointe, présente de chaque côté de la mandibule supérieure un long sillon dans la rainure duquel sont placées les narines ; les jambes de l'échasse sont si grêles qu'il a de la peine à marcher sur un terrain sec ; aussi ne fréquente-t-il que les endroits humides, les bords de la mer, les prairies inondées, où il se nourrit d'insectes, de mollusques, de grenouilles et de petits poissons.

L'échasse paraît se dédommager par son vol de la lenteur de sa marche pénible.

Les ailes sont longues, dépassent la queue, et la première penne en est plus grande que les autres ; leur couleur ainsi que celle du dos est d'un noir lustré de bleu verdâtre ; le derrière de la tête est d'un gris brun ; le dessus du cou est mêlé de noir et de blanc ; tout le dessous est blanc depuis la gorge jus-

qu'au bout de la queue. Les pieds sont rouges et d'une grandeur démesurée ; les doigts sont petits, sans pousse, et une membrane les réunit à leur base.

La race de ces oiseaux aquatiques est peu nombreuse.

On les rencontre dans toutes les contrées du monde.

Celle que l'on voit au Mexique est plus grande que l'espèce connue en Europe.

« Nous sommes, dit M. *Flourens*, peu instruits des habitudes naturelles de » cet oiseau, dont l'espèce est faible et en même temps rare. Il est vraisem- » blable qu'il vit d'insectes et de vermineux, au bord des lacs et des marais. » Plin l'indique sous le nom d'*himantopus*, et dit qu'il naît en Égypte, qu'il » se nourrit principalement de mouches et qu'on n'a jamais pu le conserver que » quelques jours en Italie. Cependant Bellon en parle comme d'un oiseau natu- » rel à cette contrée, et le comte Marsigli l'a vu sur le Danube. Il paraît aussi » qu'il fréquente les terres du Nord, quoique Klein dise qu'on ne l'a jamais vu » sur les côtes de la Baltique. »

LA HUPPE.

Cet oiseau, de l'ordre des passereaux, a la tête ornée d'une huppe de longues plumes retombant en arrière, et qui se redresse à son gré quand il éprouve quelque agitation.

Le genre des huppes renferme deux espèces, celle commune, qui appartient à l'Europe, et celle d'Afrique.

L'espèce d'Europe est de couleur rousse, avec des ailes noires rayées transversalement de blanc; une tache noire termine les plumes de l'oiseau. Le bec est long, grêle, un peu courbé, triangulaire à sa base, avec la mandibule inférieure moins longue que celle supérieure. Les narines, de forme ovale, sont placées de chaque côté à la base du bec. Les ailes de l'oiseau sont de médiocre grandeur; la queue, composée de dix plumes d'un même modèle, est taillée carrément.

La huppe est friande de vers, de scarabées, de fourmis, de larves, d'insectes, de chenilles et d'abeilles sauvages. Elle recherche les prairies humides, sur lesquelles elle court facilement, et paraît éprouver un grand plaisir à battre le terrain du bec et des pattes pour en faire sortir les insectes dont elle se nourrit.

Dans toute l'Europe, c'est un oiseau de passage, recherchant le Midi de préférence au Nord. En France, on les voit apparaître dès le printemps; une fois la belle saison passée, elles émigrent vers les pays chauds, et principalement en Égypte, où elles fréquentent les bords du Nil. Leur présence dans cette contrée annonce la retraite des eaux du Nil et la préparation aux semailles; aussi voit-on la huppe figurer dans les hiéroglyphes égyptiens.

Le cri de ces oiseaux peut se traduire par le mot *houp* répété deux fois.

La femelle place son nid, composé de mousse et de feuilles sèches, dans des creux d'arbres ou dans des fentes de rochers, quelquefois même dans un entrecroisement de branches; elle y dépose cinq à six œufs blanchâtres à taches brunes.

Leur chair est désagréable au goût à cause de son odeur de musc.

Ces oiseaux sont solitaires, sans être néanmoins sauvages, car ils se laissent facilement approcher. En Égypte, la huppe était le symbole de la piété filiale.

Il y a deux espèces de huppes, la huppe commune ou le puput, et la huppe d'Afrique.

Edouard Traversé.

LA HUPPE.

55.

Paris, LEDOT Aîné, Edit. rue de Rivoli, 174.

Imp. Bequet, à Paris.

Edouard Traversé.

LE PIC VERT.

LE PIC VERT.

Cet oiseau, de l'ordre des grimpeurs, est répandu partout où se trouvent des bois et des insectes.

Il a la tête et le cou gros et courts, le bec long, pointu et fort. Il peut, à son gré, redresser sur sa tête les petites plumes rouges qui en couvrent le sommet. Son plumage est tantôt vert ou noir, tantôt d'une teinte jaunâtre. Les jambes sont couvertes de plumes jusqu'aux extrémités.

Les ongles des deux ergots antérieurs et des deux de derrière sont garnis d'ongles pointus. Les doigts ne sont pas préhensibles.

L'oiseau, quand il grimpe sur un arbre, y semble adhérer ; sa queue, taillée en coin et composée de plumes roides et effilées, facilite son ascension ; il s'en sert comme d'un support. Il se nourrit d'insectes, qu'il poursuit tant sur les branches que dans les trous ou creux, dans lesquels il cherche à s'introduire.

Quand il n'y parvient pas, il frappe le corps de l'arbre ou les branches à coups de bec redoublés, travaillant avec la plus grande activité ; il dépouille souvent ainsi les arbres secs de leur écorce.

On entend de loin ses coups de bec, et on pourrait les compter. Si le chasseur

l'aperçoit, il lui échappe en tournant autour de la branche et en se tenant sur la face opposée. C'est à tort qu'on a dit que le pic, après quelques coups de bec, allait de l'autre côté de l'arbre pour voir s'il l'avait percé. Il n'agit ainsi que pour recueillir sur l'écorce les insectes qu'il a réveillés et mis en mouvement.

Le pic a la langue fort extensible, gluante, et qui se termine par une partie cornée, dentelée et pointue, qu'il darde contre les insectes qu'il veut atteindre. Il cherche surtout les fourmilières ; il y attend les fourmis au passage, couchant sa longue langue dans le petit sentier qu'elles ont coutume de tracer et de suivre à la file, et, lorsqu'il sent sa langue couverte de ces insectes, il la retire pour les avaler. Mais si les fourmis ne sont pas assez en mouvement, il va sur la fourmière, l'ouvre avec les pieds et le bec, et, s'établissant au milieu de la brèche qu'il vient de faire, il les saisit à son aise et avale aussi leurs chrysalides.

Ces oiseaux, loin de faire des dégâts dans les bois, détruisent au contraire l'insecte appelé mine-bois qui les attaque. Ils choisissent leurs demeures dans des creux d'arbres ou dans des trous qu'ils élargissent avec leur bec robuste, s'ils ne peuvent y pénétrer d'abord.

LE GOURA COURONNÉ.

Ce bel oiseau, du genre colombe, de l'archipel des Indes, est originaire de l'île de Banda (Malaisie). Il est remarquable par ses tarses élevés, et cependant il a le bec grêle et flexible, la tête, le cou, les pieds, le roucoulement et les mœurs du pigeon. Il niche à terre et court comme les perdrix; il atteint la taille du coq d'Inde. Une belle huppe de plumes redressées et touffues orne sa tête de couleur cendrée bleue; les barbes de chacune de ces plumes sont séparées les unes des autres. Le dos, le dessus de la queue, sont d'un cendré foncé mêlé d'un peu de marron pourpré à la partie supérieure du manteau et aux plumes scapulaires.

Le bec, les pieds et les ongles sont de couleur noire.

Le goura peut être compris dans le sous-genre indiqué par Levaillant qui

tient l'intermédiaire entre les pigeons et les gallinacés; il en a le port et les habitudes.

On trouve le goura dans l'île de Java et les contrées environnantes.

On peut l'élever dans nos ménageries et nos basses-cours, mais il est très-rare, car on a beaucoup de peine à lui faire passer l'hiver et surtout à élever les petits, qui sont très-sensibles au froid.

Le goura se nourrit, comme les gallinacés, de graines, d'insectes et de végétaux; très-farouche et très-sauvage, il se laisse difficilement approcher, s'envolant au moindre bruit, à la moindre alerte.

La chair du goura, semblable à la chair du faisan, est suave au goût et très-recherchée; aussi les naturels lui font-ils une guerre acharnée.

Imp. Bequet à Paris.

Edouard Macquie.

LE GOURA COURONNÉ.

Edouard Macquie.

LE COQ BANKIVA.

LE COQ BANKIVA.

Le coq est le chef de la famille des gallinacés, qui lui doit son nom. Le coq bankiva, d'où provient sans doute notre eoq domestique, se trouve à l'état sauvage dans l'île de Java. Il se tient dans les bois ou sur la lisière des forêts. « Il a la crête dentelée, dit M. Gervais, une collerette orangée et comme dorée autour du cou et le corps noir en dessous. La femelle est d'un roux brun, vermiculé en dessus et roux clair avec des flammes blanchâtres en dessous.

« On a aussi observé des bankivas dans les Philippines et à Sumatra. »

Monté sur des jambes robustes terminées par des pattes armées d'éperons acérés, il dresse fièrement la tête; son front est surmonté d'une crête d'un rouge vif; de la base de son bec pend une double membrane charnue de même nature et de même couleur. Il a du feu dans les yeux, de la fierté dans la démarche, de la liberté dans les mouvements et toutes les proportions qui annoncent la force et la vigueur. Les pieds ont ordinairement quatre doigts, quelquefois cinq, toujours trois en avant, et le reste en arrière; les plumes sortent deux à deux de chaque tuyau; la queue est à peu près droite, et néanmoins capable de s'incliner du côté du cou et du côté opposé.

Cette queue est composée de quatorze grandes plumes qui se partagent en deux plans égaux, inclinés l'un à l'autre, et qui se rencontrent par leur fond supérieur sous un angle plus ou moins aigu.

Les deux plumes du milieu de la queue du eoq sont beaucoup plus longues que les autres et se recourbent en arc.

Les mœurs des eoqs de toute espèce sont les mêmes: ils aiment à être entourés d'un assez grand nombre de poules dont ils prennent beaucoup de soin. Ils ne les perdent guère de vue, les conduisent, les défendent, les menacent, vont chercher celles qui s'écartent, les ramènent, et ne mangent que lorsqu'ils les voient toutes manger autour d'eux.

Il en est très-jaloux, à ce point que s'il se présente un autre eoq, il accourt contre lui, l'œil en feu, les plumes hérissées, se jette sur son rival et lui livre un combat acharné où il faut que l'un des deux succombe ou cède le champ de bataille.

Le coq est généralement reconnu comme le symbole du courage et de la vigilance.

LE CANARD MANDARIN.

Genre d'oiseau de la famille des palmipèdes, ayant le plus beau plumage de tous ceux de son espèce, remarquable par la richesse et la variété de ses couleurs et par la particulière disposition de deux plumes taillées carrément sortant de son aile et figurant deux larges ailes de papillon d'un rouge vif orangé.

Originaire du nord de la Chine, ce canard est plus petit que ses congénères; pour la forme, il a quelque rapport avec la sarcelle.

Le bec de cet oiseau est grand, épais, couvert d'une peau molle; il est dentelé par les bords, garni intérieurement d'une espèce de palais charnu, rempli d'une langue épaisse et terminé à sa pointe par un ongle corné de substance plus dure que le reste du bec; ses narines sont plus rapprochées de la tête que de la base du bec.

Ses ailes sont de longueur médiocre, ses pieds palmés; ses jambes, courtes et

placées fort en arrière, rendent sa marche dandinante et disgracieuse sur la terre.

Dans l'eau, au contraire, qui est son véritable élément, il montre de l'élégance et de l'agilité.

C'est un oiseau de luxe et d'ornement en Chine et au Japon, où il est le symbole de la fidélité, comme est en France la colombe.

Ce joli palmipède a été introduit en Hollande vers 1850, où il s'est parfaitement acclimaté, et reproduit dans les volières et les basses-cours.

De là, il a été introduit en Angleterre et enfin en France; on le remarque aujourd'hui au jardin d'Acclimatation de Paris comme un des palmipèdes les plus élégants.

Imp. Bequet & Paris

Edouard Maillot.

LE CANARD MANDARIN

Paris. LEDOT Aimé Éditeur rue de Rivoli, 174.

Edouard Maillot.

LE HARLE COURONNÉ.

LE HARLE COURONNÉ.

Cet oiseau, de la famille des lamellirostres, dans l'ordre des palmipèdes, se trouve en Virginie (États-Unis).

Il est très-remarquable par sa tête couronnée d'un beau limbe noir à la circonférence, blanc au centre et formé de plumes relevées en disque d'une élévation de plus de 60 millimètres.

Son bec est mince, allongé, de forme cylindrique et de couleur noire : il est garni de petites dents pointues dirigées en arrière.

Sa poitrine et son ventre sont blancs ; la face, le cou et le dos sont noirs.

Le harle couronné est à peu près de la grosseur du canard, avec qui il a quelques rapports.

La femelle construit son nid avec des herbes et des plumes et y dépose cinq à six œufs de couleur blanc verdâtre. Plus petite que le mâle, la femelle en diffère aussi, comme dans la plupart des espèces d'oiseaux d'eau, par ses couleurs ; elle a la tête rousse et le manteau gris.

Le harle, dit M. *Flourens*, est d'une voracité peu commune pour les pois-

sons ; sa langue est hérissée de papilles dures et tournées en arrière comme les dentelures du bec, ce qui sert à retenir le poisson glissant et même à le conduire dans le gosier de l'oiseau.

Le harle nage tout le corps submergé et la tête seule hors de l'eau ; il plonge profondément, reste longtemps sous l'eau et parcourt un grand espace avant de remonter ; quoiqu'il ait les ailes courtes, son vol est rapide, et le plus souvent il file au-dessus de l'eau.

L'chair du harle, sèche et huileuse, est détestable à manger. La forme de son corps est large et sensiblement aplatie sur le dos ; on a observé que la trachée-artère a trois renflements, dont le dernier, près de la bifurcation, renferme un labyrinthe osseux : c'est au moyen de cet appareil tout exceptionnel que l'oiseau peut si longtemps respirer sous l'eau sans remonter.

Ces oiseaux fréquentent les rivières, les lacs, les étangs et lieux marécageux.

Ils vivent de mollusques, d'insectes et de poissons.

On le trouve au Mexique et à la Caroline (Amérique septentrionale).

LE LOPHOPHORE RESPLENDISSANT.

Ce bel oiseau, de l'ordre des gallinacés, est l'un des ornements du jardin d'Acclimatation de Paris; il nous vient de l'Hindoustan, où il habite solitairement les plus hautes montagnes.

Une aigrette élégante orne sa tête : elle est formée de plumes à tiges droites et minces qui se terminent par une espèce d'épi doré.

Le manteau de l'oiseau est de couleur vert bronzé, éclatant de reflets d'or, d'azur et de pourpre. Il a environ 54 centimètres de longueur.

La femelle est plus petite que le mâle, son plumage est plus pâle, d'une teinte brune et se distingue par une raie blanche derrière l'œil.

Cet oiseau a quelque rapport avec le faisan, mais il a la voix plus forte que lui; il a les tarses courts, robustes et armés d'un fort ergot.

Il a cela de particulier, que lorsqu'il s'aperçoit qu'on le regarde, il redresse fièrement la tête, étend la queue et traîne sur le sol ses ailes agitées, comme a l'habitude de le faire le coq d'Inde.

Il s'acclimate bien dans les régions tempérées et on espère l'introduire bientôt dans les basses-cours.

Il s'est parfaitement reproduit dans le jardin d'Acclimatation de Londres, qui en possède plusieurs couples, paraissant s'être bien habitués à ce nouveau climat.

Edouard Trosset.

LE LOPHOPHORE RESPLENDISSANT.

Imp. Becquet à Paris.

Edouard Trosset.

LA BERNACHE MAGELLANIQUE.

LA BERNACHE MAGELLANIQUE.

Cet oiseau, de l'ordre des palmipèdes, plus petit que notre oie domestique, a la tête et le haut du cou d'une belle couleur rousse.

On le trouve en grand nombre au Magellan, dans la Patagonie et dans l'île de Chiloé.

Le jardin d'Acclimatation de Paris possède un couple, mâle et femelle, de ces beaux oiseaux, dont les habitudes et les mœurs n'ont pu encore être bien définies.

Le plumage du bas du cou, du ventre, de la partie antérieure du manteau de l'oiseau, est formé de bandes régulières à deux couleurs alternatives.

La queue est courte: les jambes, peu élevées, sont terminées par des doigts palmés armés de griffes avec un ergot par derrière.

Ces oiseaux fréquentent les rivières et les lacs.

La femelle fait son nid dans les roseaux ou broussailles avoisinant les eaux et les marais. La chair de la bernache est, dit-on, excellente au goût.

LE MARTIN-PÊCHEUR.

Cet oiseau, du groupe des syndactiles, cinquième sous-ordre des passereaux, a la grosseur du moineau.

Chez les Grecs, il était connu sous le nom d'alcyon.

On le distingue particulièrement à son bec, très-long, de couleur noire et orange, à trois angles, et droit, à sa queue et à ses ailes courtes, et à ses petites pattes, où le doigt du milieu est réuni avec le latéral.

On le trouve à la Nouvelle-Guinée.

Son plumage, composé de teintes bleues, vertes, rousses et blanches, est parsemé quelquefois de taches blanches sur le fond bleu, qui domine.

Les martins doivent leur surnom à leur habileté à prendre le poisson, qui est leur nourriture de prédilection ; cependant ils vivent aussi de mollusques et de vermineux, quand ils ne peuvent trouver mieux.

Tantôt ils rasent l'eau, comme les hirondelles, afin de surprendre le poisson, tantôt on les voit, perchés sur une branche, qu'ils choisissent ordinairement dénuée de feuillage, attendre patiemment qu'un poisson se montre à la surface de la rivière, et se précipiter, aussitôt qu'ils l'aperçoivent, avec la rapidité de la flèche, sur leur proie, dont ils se sont bientôt emparés.

Dans la saison d'hiver, quand les rivières sont gelées, on les aperçoit se glisser sous la glace pour y aller saisir le poisson, dont ils sont très-friands. Cette témérité cause souvent leur mort.

La femelle du martin-pêcheur ne se donne pas la peine de construire un nid ; lors de la ponte, elle dépose ses œufs dans un trou, sur le bord du rivage.

Il y a encore d'autres espèces de martins-pêcheurs : le crabier, le gros-bec, le pie, le huppé, la coiffe-noire, le collier-blanc, etc ; mais celui qui vient d'être décrit est le plus grand de son genre.

Imp. Bequet à Paris.

39.

Edouard Trouessart.

LE MARTIN-PÊCHEUR.

Paris, LEDOT Aîné, Éditeur, rue de Rivoli, 174.

LE COQ DE ROCHE.

LE COQ DE ROCHE.

Cet oiseau, de l'ordre des passereaux, est un des plus beaux de l'Amérique méridionale.

Sa grosseur est celle d'un fort pigeon.

Il a l'œil vif, le bec comprimé sur les côtés, vers l'extrémité. Sa tête est ornée d'une belle huppe, qui la couronne en demi-cercle. Le plumage du mâle est plus brillant que celui de la femelle : chez l'un, il est généralement d'une belle couleur orangée, aussitôt que l'oiseau est arrivé à l'état adulte; chez l'autre, il est entièrement brun.

La huppe de la femelle est plus comprimée, moins arrondie, et plus avancée sur le bec, que celle du mâle.

La queue, courte, est coupée carrément; elle se relève en éventail à la partie supérieure. Ses ailes, se terminant en la forme de celles des papillons, traînent presque jusqu'à terre, et les plumes qui les composent commencent par des raies blanches se détachant sur un fond brun, qui les termine. Les tarses sont robustes et à demi couverts.

Les coqs de roche sont sauvages et méfiants; mais, néanmoins, susceptibles d'être apprivoisés.

Leur vol est vif et rapide; ils se nourrissent de petits fruits sauvages, grattent la terre, battent des ailes, et se perchent, comme les poules.

Leur cri, aigu, répond à ce mot *ké*, prononcé d'une manière traînante.

Ils aiment l'obscurité, et recherchent les grandes cavernes sombres où le jour ne peut pénétrer.

On leur fait une chasse active pour s'emparer de leurs jolies plumes, que les nègres emploient comme parures.

Ces oiseaux habitent la montagne de Luca, près d'Oyapoc, et dans la montagne Courouaye, près de la rivière d'Aprouack, dans l'Amérique, enfin dans certaines parties des deux continents, ancien et nouveau monde.

Il y a, en outre, le coq de roche *du Pérou*, qui diffère du précédent en ce qu'il a la queue plus longue, que les plumes ne sont pas taillées carrément, et que les ailes ne sont pas frangées. Sa huppe, moins élevée, est composée de plumes séparées; au lieu d'être d'un rouge orangé uniforme partout, il a les ailes et la queue noires, et l'extrémité postérieure de couleur cendrée.

LA GRIVE CHANTEUSE.

Cet oiseau, de l'ordre des passereaux, ne diffère du merle que par son plumage et ses habitudes erratiques du nord au sud, et du sud au nord, suivant les saisons.

Ce plumage est marqué de taches noires en dessous, tandis que le dessus est d'un brun-olivâtre; son bec, dont la partie supérieure est mobile, et ses pattes sont jaunâtres: un jaune-roux borde ses ailes; sa gorge, ses flancs et le dessous de sa queue sont de couleur blanche; l'œil est perçant; la queue est un peu fourchue.

C'est à l'époque des vendanges que les grives arrivent, par troupes nombreuses, dans nos climats et surtout dans certains cantons de la Bourgogne; on les rencontre sur la lisière des bois; elles se nourrissent de fruits sauvages, de baies, de chenilles, d'insectes, de santerelles, de larves de toute espèce, d'escargots, dont elles brisent adroitement la coquille, et surtout de raisins mûrs, dont elles sont très-friandes.

Engraissées ainsi, leur chair est exquise et très-recherchée. On leur fait la guerre avec des lacets, des filets et à la pipée; on en prend de cette façon un nombre considérable.

Celles qui échappent émigrent, sitôt les gelées arrivées, vers des climats plus doux.

Le chant de la grive est agréable et a quelque rapport avec celui de la fauvette.

Au printemps, le mâle et la femelle travaillent ensemble à la confection de leur nid, qu'ils établissent dans les buissons, les broussailles et les pommiers; ce nid, tapissé à l'intérieur de mousse et de plumes, repose sur un tissu de racines, de roseaux, d'herbes sèches, maçonné au dehors par une terre pétrie avec des brins de paille. La femelle y dépose quatre à six œufs d'une teinte verdâtre tachés de rouille.

Les Romains, qui aimaient assurément plus encore que nous la bonne chère, regardaient les grives comme les plus délicats des oiseaux; ils les renfermaient par milliers dans d'immenses volières, les engraisaient avec une nourriture choisie composée de farine, de millet, de figues, de baies et de raisins, pour donner à leur chair une qualité exquise et savoureuse.

Ces oiseaux voyagent en Italie, en France, en Lorraine, en Allemagne, en Angleterre, en Écosse et en Suède, où ils se tiennent dans les bois qui abondent en érables.

Edouard Traviès.

LA GRIVE CHANTEUSE.

Paris, LEDOT Aîné, Edit. rue de Rivoli, 174.

Imp. Becquet à Paris.

Edouard Traviès.

L'ÉTOURNEAU.

L'ÉTOURNEAU.

Cet oiseau, de l'ordre des passereaux, a beaucoup de rapport avec le merle.

On l'appelle vulgairement sansonnet.

Son bec est droit, quelque peu déprimé, sans échancrure vers la pointe, et de couleur jaune.

Ses narines sont à demi recouvertes par une membrane; ses seconde et troisième remiges sont plus allongées que les autres; ses pieds sont d'un brun rougeâtre.

On reconnaît aisément l'étourneau à son plumage d'un noir verdâtre lustré, à reflets métalliques, parsemé de taches blanches, sauf sur les ailes, qui sont comme bordées tantôt de blanc, tantôt de jaune.

Ces oiseaux migrateurs viennent en troupes nombreuses dans nos climats, où ils choisissent les endroits les mieux exposés, les prairies et les marais. Leur nourriture consiste en graines, fourmis, vermineux, mollusques, et en fruits, tels que cerises, raisins, etc.; ils sont avides de viande crue; ils suivent les bestiaux au pâturage, attirés, dit-on, par les insectes, dont ils les débarrassent, ou par ceux qui fourmillent autour d'eux.

Les étourneaux ont un vol tout particulier, paraissant l'effet d'une tactique régulière, et soumise aux règles d'une discipline uniforme : ils obéissent au chef qu'ils se sont choisi (le plus fort d'entre eux habituellement), et leur instinct les ramène toujours au centre du bataillon volant, tandis que l'impétuosité de leur vol les emporte sans cesse au delà.

De cette manière de voler résulte l'avantage de déconcerter l'oiseau de proie, inquiété par le battement de leurs ailes, étourdi par leurs cris, et décontenancé par l'ordre de bataille, qu'il n'oserait tenter d'entamer.

Ces oiseaux se réunissent le soir en grand nombre pour se garantir ensemble des attaques de leurs ennemis pendant la nuit.

Ils jasant beaucoup le soir, et le matin surtout, avant de se séparer. Comme les merles, ils apprennent facilement à parler, et à prononcer même des phrases entières.

Ils se contentent d'un creux d'arbre pour faire leur nid, qu'ils construisent sans art.

Les étourneaux sont très-répandus en France, en Allemagne, en Suède, en Italie, au cap de Bonne-Espérance, et dans l'île de Malte.

LA GRUE COURONNÉE.

De tous les oiseaux voyageurs c'est la grue qui entreprend et exécute les courses les plus lointaines et les plus hardies.

Originnaire du Nord, elle visite les régions tempérées, et s'avance dans celles du Midi.

En automne, elle vient s'abattre dans les plaines marécageuses et les terres ensemencées de la France, puis elle se hâte de passer dans les climats plus méridionaux, d'où revenant avec le printemps, on la revoit s'enfoncer de nouveau dans le Nord et entreprendre des voyages selon les saisons.

C'est un grand et bel oiseau plutôt terrestre qu'aquatique, aux formes délicates et gracieuses; son port est droit; son cou élevé est surmonté d'une petite tête armée d'un bec droit, pointu et comprimé par les côtés.

Les grues sont remarquables par la vigueur et la durée de leur vol; dans les migrations qu'elles entreprennent c'est le chef qui vole en tête, en poussant

de temps en temps un cri auquel ne manquent pas de répondre toutes les grues ses compagnes.

Parmi les différentes espèces de grues, on distingue la grue couronnée de l'Afrique occidentale; une aigrette élégante de plumes effilées en spirale orne sa tête et lui fait comme une couronne.

De belles plumes, d'un noir plombé, avec reflets bleuâtres, pendent le long de son cou, s'étalent sur les épaules et le dos; les premières pennes de l'aile sont noires, les autres d'un roux brun, et leurs couvertures, rabattues en effilés, coupent et relèvent de deux grandes plaques blanches le fond sombre de son manteau. Une toque de duvet noir, fin et serré comme du velours, lui relève le front; l'iris de l'œil est d'un blanc pur; le bec est noir, ainsi que les pieds et les jambes qui sont encore plus hautes que celles de la grue ordinaire.

La grue couronnée habite l'Afrique et particulièrement les terres du cap Vert, de la Jambra, de Guida et de Pida.

Edouard Franquet.

LA GRUE COURONNÉE.

Paris, LEDOT Aîné, Edit. rue de Rivoli, 174.

Imp. Bequet à Paris.

Edouard Franquet.

LE HÉRON BUTOR.

LE HÉRON-BUTOR.

Cet oiseau, de l'ordre des échassiers, a la taille moins élevée et plus mince que la grue.

Son bec fort aigu, dont l'ouverture est très-large, est fendu jusque sous les yeux; la couleur en est verdâtre comme celle des pieds, l'ouverture de l'oreille est grande, la tête est noire à son sommet; des plumes longues et touffues garnissent son cou en descendant par devant la poitrine; sa démarche et sa pose sont singulières; il tient le bec en l'air, et rejette en arrière son cou enfoncé dans les épaules. Son plumage est parsemé de taches disposées plutôt en pinces qu'en étoiles, qui chargent tout le corps de mouchetures ou hachures noirâtres; elles sont jetées transversalement sur le dos, dans un fond brun fauve, et tracées longitudinalement sur un fond blanchâtre au devant du cou, à la poitrine et au ventre.

Les hérons-butors sont d'une nature triste, solitaire et sauvage.

Ils n'habitent que les marais où se trouvent beaucoup de joncs; là ils restent

des jours entiers dans la même attitude, et semblent se plaire dans la retraite et l'inaction.

Le soir, ils prennent leur vol et vont à la chasse. Ils se nourrissent de grenouilles, de petits poissons et de rats qu'ils avalent tout entiers. De leur cri sonore ils appellent leurs femelles, qui se trouvent souvent très-éloignées d'eux.

La femelle fait son nid au milieu des joncs et des roseaux, et pond quatre à cinq œufs, d'un cendré verdâtre; l'incubation dure pendant vingt-cinq jours.

Ces oiseaux se défendent et défendent leurs petits avec courage, lorsque leurs ennemis les attaquent; ils leur lancent avec persistance de rudes coups de bec qui suffisent quelquefois pour les mettre en fuite.

On les rencontre en France, en Suède, en Danemark, en Angleterre, en Suisse et en Autriche.

LE COUROUCOU RESPLENDISSANT.

Cet admirable oiseau, de l'ordre des grimpeurs, est originaire du Brésil ; ce nom de couroucou représente son cri d'une manière sensible.

Il a le bec court et gros, crochu et dentelé, plus large en travers qu'épais en hauteur, et assez semblable à celui des perroquets. Ce bec est entouré, à sa base, de plumes roides et effilées. L'œil est brillant. Son plumage, touffu et doux, brille des plus riches couleurs. La tête, le cou, le manteau et la queue sont d'un beau vert émeraude glacé d'or à reflets pourprés, et d'un éclat extraordinaire. Le dessous du ventre, jusqu'aux pattes, est d'un rouge brillant mêlé de jaune.

Les pennes qui terminent la queue du couroucou sont d'une longueur extraordinaire ; elles sont jolies, gracieuses et légères à la fois.

Ces oiseaux ont cela de particulier qu'ils ont les picds fort courts, terminés par deux doigts en arrière et deux en avant.

Ils vivent solitairement dans l'épaisseur des forêts humides, où ils se tiennent pendant le jour.

Ce n'est que le soir et le matin qu'ils prennent leur vol pour aller à la chasse des insectes dont ils font leur nourriture.

Les couroucous, dont on ne connaît guère que deux espèces, construisent

leur nid d'une manière toute particulière ; ils cherchent un trou d'arbre, le garnissent de poussière ou de bois vermoulu, et la femelle y vient pondre trois ou quatre œufs blancs de la grosseur de ceux du pigeon.

Pendant que la femelle couve, l'occupation du mâle est de lui porter à manger, de faire la garde sur un rameau voisin, et de chanter ; il est silencieux et même taciturne en tout autre temps ; mais tant que dure celui de l'incubation de la femelle, il fait retentir les échos de sons languissants.

Les petits, au moment de leur éclosion, sont entièrement nus, et on ne distingue pour ainsi dire que deux choses, c'est-à-dire la tête et le bec, qui sont d'une prodigieuse grosseur.

Du jour où les petits sont éclos, le mâle cesse de chanter pour s'occuper entièrement de la nourriture de ses petits.

Le couroucou, oiseau très-rare, n'a jamais pu être acclimaté ; aussi n'en a-t-on jamais vu en France de vivant.

Ils sont de la grosseur d'une colombe. Ce sont les plus beaux oiseaux de l'Amérique méridionale, et on les trouve communément dans l'intérieur des terres.

Quetzal Trovies.

LE COUROUCOU RESPLENDISSANT.

Imp. Bequet à Paris.

Quetzal Trovies.

LE MÉNURE LYRE.

LE MÉNURE-LYRE.

C'est un des plus rares et des plus beaux oiseaux de la Nouvelle-Hollande.

Il ressemble assez, par sa taille et son port de tête, au faisan; il a le bec recourbé et échancré à sa pointe, comme le merle.

Le plumage du ménure-lyre a la couleur d'un brun grisâtre; sa gorge, son manteau et les plumes de ses ailes sont d'un brun roux.

La queue du mâle a un type de beauté particulière : elle se compose de seize plumes; les douze ordinaires sont à barbes effilées, fortes et espacées; les deux médianes sont garnies sur un côté seulement de barbes serrées, et les deux extérieures sont larges et recourbées en forme d'une lyre antique.

L'oiseau semble glorieux d'étaler cette belle queue, dont la femelle est privée, quoiqu'elle ait le même nombre de plumes.

Comme celles du paon, les plumes de la queue du ménure-lyre tombent

tous les ans, et comme si cet oiseau sentait la privation de son plus bel ornement, il cherche les endroits cachés pour ne reparaitre qu'avec toute sa gloire, c'est-à-dire avec sa queue, qu'il semble admirer lui-même.

Très-rare, les ménures-lyres n'ont jamais pu être acclimatés; ils vivent bien pendant quelques mois à l'état captif; mais, passé ce délai, soit ennui, soit manque de chaleur, ils dépérissent, se déplument et succombent bientôt victimes d'une véritable maladie de langueur.

Les ménures-lyres se nourrissent d'insectes, de vers et de mollusques; comme les poules, elles grattent la terre; elles ont du rapport avec les gallinacées en ce que les femelles suivent habituellement le mâle.

Ces oiseaux habitent les forêts et recherchent la solitude.

Ils ne sortent guère que le matin et le soir et restent perchés sur les arbres pendant la durée du jour.

LE DINDON.

Le dindon est originaire de l'Amérique septentrionale. Cette race comprend deux espèces : l'une sauvage et l'autre réduite en domesticité. Cette dernière est acclimatée en Europe depuis le seizième siècle. C'est le plus remarquable et l'un des plus grands de nos gallinacés.

Le beau plumage du mâle, son œil vif, sa démarche fière le distinguent particulièrement.

Sa tête, qui est fort petite à proportion de son corps, entièrement dénudée de plumes, est, ainsi qu'une partie du cou, recouverte d'une peau bleuâtre chargée de mamelons rouges dans la partie antérieure du cou, et de mamelons blanchâtres sur la partie postérieure de la tête. De la base du bec descend par le cou, jusqu'au tiers environ de sa longueur, un appendice charnu, rouge et flottant, composé d'une double membrane. Si le dindon est irrité ou contrarié dans ses amours, aussitôt la caroncule qui recouvre son bec se déploie, s'allonge, toutes les parties charnues de sa tête et de son cou se colorent d'un rouge plus vif, les plumes du cou et du dos se hérissent et la queue se relève en éventail, tandis que les ailes s'abaissent en se déployant jusqu'à traîner par terre. Sa démarche devient fière et grave, il jette un cri ou gloussement perçant, qu'on peut lui faire répéter en sifflant; il recommence à faire la roue, qui, suivant qu'elle s'adresse à sa femelle ou aux objets qui lui font ombrage, exprime tantôt son amour et tantôt sa colère. S'il s'irrite ou entre en fureur, il s'élance alors et attaque à coups de bec, faisant tous ses efforts pour éloigner l'objet qui lui paraît insupportable.

Les orifices des narines du dindon sont dans le bec supérieur et ceux des oreilles sont en arrière des yeux fort couverts et comme ombragés par une multitude de petites plumes suivant diverses directions.

Il a une touffe de soies longues et roides qui flotte au-devant de sa poitrine.

Cet oiseau s'appelle aussi coq d'Inde. C'est aux noces de Charles IX (1570) qu'il figura, dit-on, pour la première fois comme un mets digne d'un roi. Il ne devint commun en France qu'à partir de 1630.

Dans l'état de domesticité, le dindon est timide et craintif et ne fraye pas avec les autres oiseaux de la basse-cour.

Les œufs de la dinde sauvage, s'ils sont donnés à couvrir par une poule domestique, produisent des sujets très-recherchés.

La chair du dindon domestique est excellente; celle de la dinde a quelque chose de meilleur encore.

Il y a plusieurs variétés de dindons : la noire, la blanche, la grise et la pourprée.

A l'état sauvage, les dindons vont ordinairement par troupes de cent et plus; ils sont plus gros que ceux que l'on voit en France et pèsent jusqu'à 48 kilogrammes.

Ils ont le plumage plus noir et ont les mêmes mœurs et les mêmes habitudes; ils ne manquent pas d'instinct et ne sont pas si stupides qu'on a bien voulu le dire.

Il n'est pas avéré non plus que les jésuites aient importé le dindon en Europe.

Edouard Trossier.

LE DINDON.

Imp. Bequet à Paris.

Edouard Trossier.

LA PINTADE.

LA PINTADE.

Cet oiseau, de l'ordre des gallinacés, nommé aussi poule de Numidie ou de Barbarie, est originaire du nord de l'Afrique; sa grosseur est celle d'une très-forte poule.

Son corps épais et arrondi, sa tête nue comme celle des dindons, garnie de barbillons charnus, que surmonte une crête cornée, un plumage gris ardoise, parsemé de taches blanches arrondies, faites comme au pinceau, et sa queue courte, font remarquer la pintade parmi tous les autres gallinacés.

Quoique l'ornement d'une basse-cour, on l'y élève rarement et cependant elle pond beaucoup, et sa chair, très-délicate, est très-recherchée. Mais, comme le dit Buffon, « c'est un oiseau vif, inquiet et turbulent, qui n'aime point à se tenir en place, qui se rend maître dans la basse-cour, il se fait craindre des dindons même, et, quoique plus petit, il leur impose par sa pétulance. »

Ses petits sont difficiles à élever dans nos climats et demandent des soins tout particuliers.

La pintade gratte la terre, perche et aime à se rouler dans la poussière; comme les poules, son vol est lourd, mais elle court rapidement. Elle se nourrit d'insectes, de grains, d'œufs de fourmis, etc.

Elle a été transportée des pays chauds en Europe au commencement du seizième siècle.

Les œufs de la pintade, plus petits que ceux de la poule, sont d'un rouge sombre et n'ont pas de taches. La femelle les cache dans son nid, qu'elle fait dans les buissons ou dans les haies.

A l'état sauvage on la trouve dans l'Afrique méridionale, où elle vit en troupes nombreuses.

Les anciens connaissaient les pintades sous le nom de méléagris; ils supposaient qu'elles provenaient de la métamorphose des sœurs de Méléagre; les larmes versées étaient représentées par les taches blanches de leur plumage.

LE MESSENGER ou SECRÉTAIRE.

Cet oiseau, de l'ordre des rapaces, est aussi nommé serpentaire, à cause de son goût spécial pour les serpents. Il a la hauteur d'une grande grue et la grosseur d'un coq d'Inde. Il a le port fier, la démarche vive et rapide; les couleurs de sa tête, de son cou et de tout le manteau sont d'un gris bleuâtre, qui deviennent plus claires sur le devant de son corps. Il a du noir aux pennes des ailes et de la queue, et les jambes emplumées comme tous les oiseaux de proie.

Il est hant monté sur les jambes comme un échassier, a un bec robuste, crochu et fendu jusqu'au delà des yeux. L'œil est entouré d'une peau nue de couleur orangée.

Une huppe de longues plumes roides et inégales, de couleur noire, qu'il porte à l'occiput, lui a fait donner le nom de secrétaire, parce qu'il paraît ressembler ainsi à certains écrivains qui portent assez souvent leur plume derrière l'oreille.

Sa queue, très-étagée et noire en partie, porte deux pennes plus longues que les autres.

Avec les armes des oiseaux carnassiers, il n'a rien de leur férocité; doux et

pacifique, il n'attaque jamais que les serpents, qu'il dépèce avec plaisir pour en faire sa nourriture.

Il fait aussi la chasse aux rats, aux lézards, aux sauterelles, aux crapauds et aux petites tortues, qu'il avale tout entières après les avoir brisées.

Comme il ne fréquente que les plaines désertes, s'il s'aperçoit qu'on l'observe, il fuit rapidement par sauts de plus de deux mètres; cette rapidité lui a fait donner aussi le nom de messenger. La nuit, il aime à percher sur le sommet des arbres.

La femelle fait son nid dans le haut des buissons ou à la cime des arbres; elle y dépose deux ou trois œufs d'un blanc tacheté de roux, de la grosseur de ceux de l'oie.

Pris jeune, le messenger peut s'appivoiser et s'habitue facilement à la basse-cour.

Le cri du messenger ressemble assez à celui de l'aigle. Quoique originaire d'Afrique, il paraît qu'il s'accommode assez bien du climat d'Europe.

Edouard Traviès.

LE MESSAGER.

Imp. Dequet à Paris

Edouard Traviès.

LE KAMICHI.

LE KAMICHI.

Cet oiseau, de l'ordre des échassiers, a quelque ressemblance avec les gallinacés. Il a la forme et la taille d'un très-fort dindon; il porte la tête haute; sa démarche est grave. Il a la voix forte et presque effrayante : son cri retentissant correspond à ce mot : vyhou vyhou.

Le plumage du kamichi est noir ; il est remarquable par la force de ses armes ; ainsi, il porte à l'extrémité antérieure de chacune de ses ailes un puissant éperon et sur la tête une corne pointue de 10 centimètres environ de longueur sur 5 centimètres de diamètre à sa base.

Cette corne, implantée sur le haut du front, s'élève droite et se termine par une pointe aiguë un peu courbée vers sa base ; elle est revêtue d'un fourreau, qu'on peut comparer au tuyau d'une plume.

Quoique possédant un appareil d'armes très-offensives, qui le rendrait redoutable, le kamichi est doux et paisible, n'attaque pas les autres oiseaux et ne fait la guerre qu'aux reptiles. Néanmoins, pendant la saison des amours, il s'irrite et devient querelleur, mais seulement envers les mâles de son espèce. Il attaque

alors violemment son rival, avec autant d'animosité que le coq, et l'un des deux combattants doit périr ou céder le terrain.

Le kamichi a les jambes courtes, les ailes et la queue longues, la tête et le haut du cou garnis de petites plumes duveteuses, relevées et comme demi-bouclées, mêlées de noir et de blanc ; le bas est revêtu de plumes plus larges, plus fournies, noires au bord et grises en dessous. Tout le manteau est noir brun, avec des reflets verdâtres et quelquefois mêlés de taches blanches ; les épaules sont marquées de roux, et cette couleur s'étend sur le bord des ailes, qui ont beaucoup d'ampleur.

Le pied est couvert d'une peau rude et noire, dont les écailles sont fortement dessinées sur les trois doigts séparés, qui sont très-longs et armés, ainsi que le pouce, de robustes griffes.

Les kamichis se nourrissent d'herbe et de végétaux, comme les oies ; la chair des jeunes, quoique noire, est bonne à manger ; on ne les voit pas fréquenter les bois, mais les lieux découverts et humides paraissent leur convenir. Ils sont d'un naturel défiant et ne se laissent pas facilement approcher. On les rencontre à la Guyane, au Brésil et dans beaucoup de contrées de l'Amérique.

LE TRAGOPAN DE HASTINGS.

Ce magnifique oiseau, de l'ordre des gallinacés, se trouve dans l'Indoustan et dans tout le massif de l'Himalaya.

Son port rappelle un peu celui du faisan. Son plumage brille de vives couleurs.

Son œil, plein de vivacité et de feu, brille au milieu d'un rouge éclatant.

On remarque à sa gorge deux lambeaux charnus de couleur bleue qui retombent comme chez les dindons.

Sa tête est surmontée d'une aigrette de plumes d'un bleu foncé retombant avec grâce en arrière; de chaque côté de la tête apparait une espèce de corne mince, susceptible de se dilater.

Les tarses du mâle sont armés d'un ergot.

Le plumage du tragopan est des plus élégants; il est lustré de couleur tantôt rouge, tantôt brune, et parsemé de taches blanches, dont les unes sont rondes et les autres en forme de larmes, comme on en voit sur la pintade.

De belles et larges plumes viennent terminer le manteau de l'oiseau, en s'éta-geant gracieusement sur sa queue, qui descend jusqu'à terre.

Le tragopan est, comme tous les gallinacés, un oiseau pesant, à la démarche grave et lente, et qui, n'ayant que des ailes très-courtes, ne vole que très-rarement, et quelquefois avec des cris indiquant la terreur.

Le tragopan est à la fois granivore et carnivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit de grains et de cailloux qu'il digère très-bien.

Comme le coq, il dort toujours perché sur une branche et un pied en l'air, cachant quelquefois sa tête dans ses ailes, suivant les degrés de la température.

La femelle, en général peu productrice, ne fait que deux pontes par an, au mois d'avril et au mois d'août.

Les petits, en venant au monde, sont couverts d'un duvet soyeux et courent de suite en cherchant eux-mêmes leur nourriture sous l'aile protectrice de leur mère.

Imp. Bequet, à Paris.

Edouard Traviès.

LE TRAGOPAN DE HASTINGS.

Paris, LEDOT Amé Edit rue de Rivoli, 174.

Edouard Traviès.

LE GRAND COQ DE BRUYÈRE.

LE COQ DE BRUYÈRE.

Ce coq sauvage, qu'on n'a pu encore réduire en domesticité, est le plus grand des gallinacés. Il cherche les climats froids. Dans ceux qui sont tempérés, il se plait dans les taillis épais et dans les forêts montagneuses. Il a quelques rapports avec le coq ordinaire, soit par la forme du corps, le port de sa tête, soit par la peau rouge dont ses yeux sont surmontés, et la combinaison de ses plumes, qui sont presque toutes doubles et sortant deux de chaque tuyau ; comme lui, il gratte la terre pour chercher sa nourriture, et quand il boit, prend de l'eau dans son bec et lève sa tête chaque fois qu'il veut l'avalier. Il a les pattes fermes et vigoureuses, mais elles ne sont pas armées d'éperons ; ses pieds sont couverts de plumes par devant et ses doigts sont dentelés par les bords : l'ouverture des narines est recouverte par de petites plumes qui naissent de la base du bec et se dirigent en avant ; il n'y a point de membrane pour le bec ; il a dans la queue deux pennes de plus que le coq ordinaire.

C'est surtout dans le temps de ses amours qu'il relève cette queue en éventail, comme le fait le coq d'Inde.

Le plumage du coq de bruyère est généralement d'un beau noir lustré, à reflet métallique, d'une couleur verdâtre ; la flamme semble sortir de ses yeux brillants ; ses sourcils sont couleur de feu.

Son bec est fort et tranchant : dès le printemps, le mâle, perché sur un gros arbre, la tête portée fièrement, la queue en éventail, les ailes trainantes, fait retentir les bois de son cri perçant pour appeler ses femelles ; il s'étourdit si fort lui-même, il est tellement dominé par son amour, qu'il oublie son naturel sauvage et farouche, se laisse approcher et ne voit pas le chasseur dont il devient facilement la victime. Le coq de bruyère se nourrit de sommités ou bourgeons de sapin, de genévrier, de saule, de fleurs de blé sarrasin, de trèfle, de vesce et de plantes tendres ; il est friand d'œufs de fourmis, de faines et de mûres sauvages.

La femelle est plus petite que le mâle ; son plumage est de couleur fauve, avec des lignes transversales de brun noir ; elle ne fait pas de nid, mais dépose sur la fougère ou sur la mousse dix à quinze œufs qu'elle couve avec amour.

Le coq de bruyère est un excellent gibier ; on le trouve dans les Alpes et les Pyrénées, sur les montagnes d'Auvergne, de Savoie, de Suisse, de Westphalie, de Souabe, de Russie, de Norvège, d'Ecosse, et même dans l'Amérique septentrionale.

LE LORIOT.

Cet oiseau, de l'ordre des passereaux, est à peu près de la grosseur du merle; son bec est plus large; il est arqué, comprimé, et de couleur incarnat; ses tarses sont plus courts; l'iris de ses yeux est d'un rouge vif; ses pieds sont d'un noir bleu, armés d'ongles noirs.

La tête, le cou et tout le corps sont d'un beau jaune, sauf un trait noir, allant de l'œil à l'angle de l'ouverture du bec.

Les ailes et la queue sont noires, à quelques taches jaunes près; le noir domine sur la queue, qui se termine par du jaune.

Les loriots, très-peu sédentaires, changent souvent de contrées, et paraissent ne séjourner dans les nôtres que pendant le temps nécessaire pour se reproduire.

Lorsqu'ils arrivent au printemps, ils font la guerre aux insectes, aux chenilles, aux larves, aux scarabées; mais ce dont ils sont le plus friands, ce sont les cerises, les figues, les baies de sorbier, les pois, et il ne faudrait que quelques loriots pour dévaster un cerisier en un jour, becquetant les cerises les plus mûres sans en manger aucune entièrement; aussi leur fait-on une chasse acharnée; on les attend quand ils viennent à la picorée, ou on les prend aux appeaux

en imitant leur cri dur ou leur sifflement guttural répété deux ou trois fois et pouvant se traduire ainsi : o liou, liou, liou.

Ils sont très-difficiles à apprivoiser; on les trouve souvent par couples sur le bord des rivières et la lisière des bois, là surtout où se trouvent de grands arbres; quand viennent les froids, ils émigrent pour les pays chauds. Ils se sont répandus dans les contrées les plus lointaines, au Bengale, en Chine, sans que leur plumage et leur forme extérieure aient été aucunement altérés.

L'industrie avec laquelle les loriots façonnent leur nid est remarquable : au lieu de le fixer, comme les autres oiseaux, à la bifurcation de branches perpendiculaires, ils enlacent autour de deux rameaux de forme horizontale d'un grand arbre, peuplier ou chêne, de longs brins de paille ou de chanvre, dont les uns forment le bord du nid, et les autres, pénétrant dans l'intérieur, donnent de la solidité à leur ouvrage; le dedans du lit se compose de mousse, de lichens et d'autres matières douces, formant comme une ouate moelleuse.

La femelle y dépose quatre ou cinq œufs, d'un blanc sale, ayant des taches irrégulières, à points bruns noirâtres vers le gros bout; elle couve ses œufs pendant vingt et un jours, et les défend avec un courage aveugle contre les entreprises de ses ennemis.

Edouard Inverès.

Imp. Bequet à Paris.

LE LORIENT.

Paris, LEDOT Aîné Éditeur, rue de Rivoli, 174.

Edouard Inverès.

LE GEAI.

LE GEAI.

Cet oiseau est de la famille des passereaux. Il est toujours en agitation, criard, colère et méchant ; aussi lorsqu'il se trouve en cage, altère-t-il la beauté de son plumage par ses frottements continuels et ses brusques mouvements.

Il est moins gros que la pie, avec qui il a quelques rapports, notamment cette manie de dérober tout ce qu'il trouve à sa disposition : son plumage est des plus gracieux ; de petites plumes douces et soyeuses, à la naissance de ses ailes, sont marquées d'une couleur bleu d'azur et rayées, transversalement, d'une nuance bleue plus prononcée.

La tête est plus grosse chez le mâle que chez la femelle ; son bec, court, assez fort, peu courbé, offre une petite échancrure derrière sa pointe. Son front est orné d'une huppe légère composée de petites plumes noires, bleues et blanches, qu'il élève ou abaisse à son gré.

Le plumage du mâle est plus beau que celui de la femelle. Les geais s'appri-voisent facilement ; ils s'habituent à l'état de domesticité, seulement ils se montrent

d'une extrême pétulance dans leurs cages, que le temps lui-même est impuissant à calmer.

Ils se nourrissent de noisettes, de glands, de pois, de fèves, de châtaignes, de cerises, de groseilles, de framboises.

Ils sont très-friands de nids d'oiseaux, dont ils dévorent les œufs, ou les petits trop faibles pour échapper à leurs poursuites.

Ils vivent de huit à dix ans.

On trouve ces oiseaux en Angleterre, en Écosse, en Allemagne, en Italie, en Suède, dans toutes les contrées d'Europe, en un mot, et dans celles correspondantes de l'Asie.

Mentionnons une variété dans cette espèce : le geai blanc, qui a une marque bleue aux ailes ; il ne diffère du geai ordinaire que par la blancheur de son plumage, qui s'étend jusqu'au bec et aux ongles, et par la rougeur de ses yeux.

LES OISEAUX-MOUCHES.

Les trochilidés, connus sous le nom de colibris et d'oiseaux-mouches, habitent tous l'Amérique et se distinguent en général par la gracieuseté de leurs formes et l'éclat de leurs couleurs. Au nombre des plus jolies espèces de cette grande famille nous vous citerons l'oiseau-mouche proprement dit, connu pour la variété de son plumage et l'élégance de ses formes.

Merveille de la création, l'oiseau-mouche est le plus petit et le plus joli des oiseaux ; son plumage est diapré des plus riches couleurs empruntées au rubis, au saphir, à l'émeraude et à la topaze ; toujours dans les airs, il vole de fleur en fleur, butinant dans leur calice les insectes qui s'y cachent ; car c'est à tort qu'on avait cru longtemps qu'il se nourrissait du nectar des fleurs.

Ce petit oiseau, ce bijou est à peine long de 30 millimètres, de la pointe du bec au bout de la queue : le bec a 7 millimètres, la queue 8 millimètres, en sorte qu'il ne reste qu'un peu plus de 18 millimètres pour la tête, le cou et le corps, dimensions moindres que celles de nos grosses mouches.

Son bec est égal dans sa longueur, un peu renflé vers le bout, comprimé horizontalement, et droit. Sa langue, fendue en deux parties, s'écarte et se rapproche à la volonté de l'oiseau comme une pince, de manière à pouvoir pomper comme avec un siphon le nectar des fleurs.

Malgré sa petite taille, l'oiseau-mouche est courageux, et sait se défendre, même contre un ennemi plus fort que lui : il s'attache à sa poursuite, en cherchant à lui crever les yeux avec son bec acéré.

Au nombre de ses plus redoutables ennemis se trouve le mygale-crabe, immense araignée, qui guette le moment où les petits viennent d'éclore pour les dévorer dans leur nid.

D'un caractère peu sauvage, l'oiseau-mouche se laisse approcher de très-près, comme le papillon ; mais si on veut le saisir, il fuit alors comme un trait,

redoutant la captivité ; aussi se sert-on pour le prendre de petits filets pour pouvoir le saisir au vol.

« Leur vol, dit Buffon, est continu, bourdonnant et rapide ; le battement des ailes est si vif que l'oiseau, s'arrêtant dans les airs, paraît, non-seulement immobile, mais tout à fait sans action. On le voit s'arrêter ainsi quelques instants devant une fleur et partir comme un trait pour aller à une autre ; il les visite toutes, plonge sa petite langue dans leur calice, les flatte tant de ses ailes, sans jamais s'y fixer, mais aussi sans les quitter jamais. »

Le nid des oiseaux-mouches, à la fois délicat et gracieux, se compose d'une petite capsule soyeuse et feutrée, tapissée de mousse et de duvet, où la femelle vient déposer deux fois par an deux petits œufs complètement blancs, de la grosseur d'un petit pois.

Dix jours sont seulement nécessaires pour l'éclosion des petits qui, à leur naissance, sont de la grosseur d'une petite mouche.

Rien de gracieux comme ces petits êtres voltigeant avec la mère qui les guide. On trouve les oiseaux-mouches au Brésil et aux Antilles.

Ils servent de parure aux indigènes, qui en font, soit des colliers, soit les ornements de leur coiffure.

Les espèces les plus nombreuses paraissent confinées entre les deux tropiques ; car celles qui s'avancent en été dans les zones tempérées n'y font qu'un court séjour ; elles semblent suivre le soleil, s'avancer, se retirer avec lui et s'envoler sur l'aile des zéphirs à la suite d'un printemps éternel.

Les oiseaux-mouches, malgré tous les soins dont on a cherché à les entourer, ne vivent pas en captivité ; la cage pour eux est une véritable prison, où ils périssent bientôt de langueur, car ce qu'il faut à ces oiseaux, gracieux et privilégiés, c'est l'espace, la liberté, et surtout les fleurs.

Imp. Bequet à Paris.

Oiseaux Mouches. Le Hausse-Col blanc. L'Oiseau-Mouche aux nappes d'Or, la Jacobine (Grandeur naturelle) Brésil

Paris chez moi Edit. Rue de Rivoli 174

N° 47.

London E. Gambart & Co. 25 Berners St. Oxford St.

LE PAON.

Cet oiseau, dont le magnifique plumage est si connu, est de l'ordre des gallinacés.

Chez les Grecs, il était consacré à Junon ; le paon est digne en effet de la fière déesse, car il est fier comme elle.

Si l'empire appartenait à la beauté, dit Buffon, le paon serait, sans contredit, le roi des oiseaux : il n'en n'est point sur qui la nature ait versé ses trésors avec plus de profusion. Taille, port imposant, démarche fière, proportions sveltes et élégantes, tout annonce un être plein de distinction ; une aigrette mobile et légère, peinte des plus riches couleurs, orne sa tête gracieuse. Son incomparable plumage semble réunir tout ce qui flatte nos yeux dans le coloris tendre et frais des plus belles fleurs, tout ce qui éblouit dans les reflets pétillants des pierreries, tout ce qui les étonne dans l'éclat majestueux de l'arc-en-ciel ; les longues plumes de sa queue déploient, en se relevant, leurs richesses éblouissantes. Sa tête et son cou se renversent noblement en arrière, se dessinant avec grâce sur ce fond radieux, où la lumière du soleil se joue de mille manières.

Le paon fut rapporté à Salomon lors du retour des expéditions lointaines entreprises par les flottes de ce roi puissant.

Puis, Alexandre le Grand, lors de la conquête des Indes, l'importa en Europe.

On trouve le paon à l'état sauvage dans les îles de l'Inde, dans l'Asie du Sud, et jusqu'au Japon : son plumage est bien plus brillant qu'en l'état de domesticité.

Il aime à se percher dans les arbres élevés des forêts de l'Inde.

La femelle est plus petite que le mâle ; elle n'en a ni les brillantes couleurs, ni la queue magnifique.

Elle ne fait qu'une seule ponte, de dix à douze œufs, qu'elle couve pendant trente jours environ.

Elle élève ses petits paonneaux avec un soin extrême, les portant souvent sur son dos, leur apprenant à se percher jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour le faire eux-mêmes.

A l'époque de la mue, qui a lieu vers le mois d'août, les plumes de la queue du paon tombent ; pendant tout le temps qui suit, jusqu'au printemps, il se cache, comme humilié de la perte de ses plus beaux ornements, et ne reparait alors que pour venir encore jouir des hommages dus à sa beauté ; cette beauté ne laisserait rien à désirer si les pattes de l'oiseau étaient mieux faites et s'il n'avait pas un cri désagréable.

On cite dans l'antiquité les repas somptueux des derniers empereurs romains où l'on servait, à cause de leur rareté, des plats de cervelles et de langues de paon.

Aujourd'hui on ne recherche plus que la chair des paonneaux, et encore ne vaut-elle pas celle de nos délicates volailles du Mans.

Si on sert un paon rôti sur la table, c'est alors comme objet de luxe, parce qu'on y a adapté avec art la tête, le cou, les ailes, et la riche queue de l'oiseau déployée en éventail.

Le paon se nourrit de toutes sortes de graines ; la fleur du sureau lui est contraire, et la feuille d'ortie est mortelle aux paonneaux.

Il existe deux variétés de ces oiseaux : l'une, entièrement blanche, originaire des deux climats de l'Inde et de l'Asie : le jardin d'Acclimatation de Paris en possède plusieurs sujets ; cette espèce vit bien en l'état de domesticité ; l'autre panachée blanc et couleur, de la belle espèce ci-dessus : seulement les miroirs de sa queue ne sont ni si larges, ni si ronds, ni si bien terminés.

La durée de la vie du paon est d'environ vingt à trente ans.

48.

Imp. Bequet, à Paris.

LE PAON.

Paris. LEDOT Aîné Éditeur de Rivoli. 174.

Edouard Mureau.

TABLE DES PLANCHES.

<p>Le Kangourou enfumé et le Kaola..... 25</p> <p>Le Renard et le Lièvre..... 26</p> <p>Le Porc-Épic et le Hérisson..... 27</p> <p>Le Lemming et le Hamster..... 28</p> <p>La Loutre et le Castor..... 29</p> <p>L'Agouti et l'Ornithorhynque..... 30</p> <p>Le Tatou en coubert et l'Ai à dos brûlé..... 31</p> <p>La Gazelle corinne et l'Antilope bubale..... 32</p> <p>Le Calao Rhinocéros et le Toucan du Para... 33</p> <p>La Spatule et l'Échasse..... 34</p> <p>La Huppe et le Pic-Vert..... 35</p> <p>Le Goura couronné et le Coq Bankiva..... 36</p> <p>Le Canard Mandarin et le Harle couronné... 37</p>	<p>Le Lophophore resplendissant et la Bernache Magellanique 38</p> <p>Le Martin-Pêcheur et le Coq de Roche.. 39</p> <p>La Grive chanteuse et l'Étourneau..... 40</p> <p>La Grue couronnée et le Butor.. 41</p> <p>Le Couroucou resplendissant et le Ménure-Lyre. 42</p> <p>Le Dindon et la Pintade..... 43</p> <p>Le Messenger et le Khamichi..... 44</p> <p>Le Tragopan de Hastings et le grand Coq de bruyère 45</p> <p>Le Lorient et le Geai. 46</p> <p>Les Oiseaux-Mouches..... 47</p> <p>Le Paon..... 48</p>
---	--

39088003031960